

Gehörstörung?  
Gehstörung?

Sensibilitätsstörung?  
Sensibilitätsstörung?

Taubheitsgefühl?

HANDLE SOFORT!

### Erkennung eines Schlaganfalls

- » Bitten Sie die Person, zu lächeln.
- » Bitten Sie die Person, einen einfachen Satz nachzusprechen, zum Beispiel:  
„Ich benötige keine Hilfe.“
- » Bitten Sie die Person, gleichzeitig beide Arme nach vorne zu heben, Handflächen nach oben.



### Wichtige Adressen

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Postfach 104

33311 Gütersloh

Tel.: 05241/97700

<http://www.schlaganfall-hilfe.de>

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation

Walter-Kolb-Straße 9–11

60594 Frankfurt/Main

<http://www.barfrankfurt.de/Startseite.BAR>

### Inhalt:

Christian Winkelmann, Jennifer Gruber

Jonathan Fleck

Schüler des Ausbildungszentrums für Pflegeberufe

Semester H06



# 112

## ZEIT IST LEBEN!

## Schlaganfall = Notfall

Sehstörung?  
Sprachstörung?

Lähmungen?  
Schwindel?

# SCHLAGANFALL

## Was ist ein Schlaganfall


Unter dem Begriff „Schlaganfall“ verstehen Mediziner die Folgen einer plötzlichen Sauerstoff-Mangelversorgung eines bestimmten Gehirnbereichs.

In vier von fünf Fällen liegt ein Stopp der Blutversorgung durch ein Blutgerinnsel, einen so genannten Thrombus, zugrunde.

Seltener ist der Schlaganfall, der durch eine Hirnblutung hervorgerufen wird. Nur jeder fünfte Patient ist davon betroffen.




## Schlaganfall Symptome



Sehstörungen



Schwindel



Sprachstörungen



Lähmungen

## Therapie: So früh wie möglich

### Der erste Schritt:

Sofort telefonisch den Notruf 112 verständigen.

**Ein Schlaganfall ist ein Notfall**

Nach einem Schlaganfall werden die Ärzte gegebenenfalls versuchen, das verschlossene Blutgefäß wieder zu öffnen.

Dazu bekommt der Patient ein Medikament, das das Blutgerinnsel im Gefäß auflösen soll (Lyse). Dies ist jedoch nur drei, bis zu sechs Stunden, in Ausnahmefällen auch noch länger nach Eintreten der ersten Symptome möglich und mit einer großen Blutungsgefahr verbunden.

Deshalb muss dieses Verfahren mit großer Sorgfalt in so genannten „Stroke Units“ angewendet werden. Diese Therapie kann aber nicht bei jedem Patienten angewendet werden. Eine schnelle Benachrichtigung des Notarztes ist im Falle der ersten Symptome die wichtigste Maßnahme.

Während der Behandlung im Krankenhaus werden bereits erste Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie).

Meist findet im Anschluss des stationären Aufenthalts der flüssige Übergang in eine Rehabilitationseinrichtung statt. Dort wird der Betroffene rund um die Uhr gefördert und gefordert.

Die Therapien werden individuell angepasst und gestaltet.